

Левитра - Инструкция по применению

Одобрено
Фармакологическим государственным
комитетом Минздрава России
17 февраля 2003 г.

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (Информация для потребителей) *Левитра (LEVITRA)* (Варденафил)

Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком Левитры, то есть ее аналогом. Данная инструкция применима к Левитре и к любому ее дженерику.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата.

- Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
- Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы, то обратитесь к врачу или фармацевту.

1. Общие сведения о препарате.

1.1. Торговое (патентованное) название препарата

Левитра

1.2. Международное (непатентованное) название

Варденафил

1.3. Лекарственная форма и назначение

Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.

1.4. Состав

Активное вещество: варденафил 5, 10 или 20 мг. (5.926, 11.852 или 23.705 мг варденафила гидрохлорида тригидрата, соответственно).

2. Показания к применению

Лечение нарушений эрекции, характеризующихся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового акта. Варденафил эффективен только при наличии сексуальной стимуляции.

3. Противопоказания

Применение Левитры (варденафила) запрещено:

- лицам, не достигшим 18-ти лет;
- при гиперчувствительности к веществам препарата (варденафилу);

Левитра - Инструкция по применению

- одновременное применение Левитры в любых дозах и формах с донаторами оксида азота или нитратами (Сустак, Нитроглицерин, Нитронг, Нитросорбид, Эринит и др.)
- одновременное применение с афродизиаками: амилнитритами или нитритами (попперсами)
- при острой сердечной недостаточности, аритмии, артериальной гипертензии (артериальное давление (АД) > 170/100 мм рт. ст.;) или гипотония (АД <90/50 мм рт. ст.).
- при нестабильной стенокардии, а также мужчинам, перенесшим острый инфаркт миокарда, инсульт в последние 6 мес.

С осторожностью следует принимать:

- при различных заболеваниях сердца и сосудов;
- при анатомических деформациях полового члена (искривление, кавернозный фиброз, болезнь Пейрони);
- при серповидно-клеточной анемии (наследственной гемоглобинопатии);
- при множественной миеломе (опухоли); лейкозе (заболевании костного мозга).
- при тяжелой степени печеночной недостаточности;
- при терминальной стадии почечной недостаточности, требующей проведения диализа;
- при наследственных дегенеративных заболеваниях сетчатки (например, с пигментной ретинопатией);
- при неконтролируемом повышением артериального давления;
- при склонности к кровотечениям и с обострением язвенной болезни.

Применение при беременности и лактации.

По зарегистрированному показанию препарат не предназначен для применения у женщин.

Применение у детей.

Левитру не следует давать детям.

4. Способ применения и дозы.

Левитру принимают внутрь по одной таблетке за 30-60 минут до планируемой сексуальной близости. Дозировка устанавливается индивидуально с учетом эффективности и переносимости. Левитру можно принимать независимо от приема пищи.

Рекомендуемая разовая доза – 10 мг в сутки.

Максимальная доза – 20 мг в сутки (назначается мужчинам с сахарным диабетом, простатэктомией, т. к стартовая доза в 10 мг является малоэффективной.)

Минимальная доза – 5 мг в сутки (рекомендуется мужчинам старше 65 лет).

У пациентов с умеренными нарушениями функции печени отмечается снижение клиренса варденафила, поэтому начальная доза Левитры должна составлять 5 мг/сут. У пациентов с незначительными нарушениями функции печени изменения режима дозирования Левитры не требуется.

Левитра - Инструкция по применению

У пациентов с незначительными, умеренными и тяжелыми нарушениями функции почек изменения режима дозирования Левитры не требуется.

Продолжительность действия препарата составляет 10-12 часов.

Левитра поможет вам с эрекцией, если вы сексуально возбуждены. Вы не сможете получить эрекцию, просто приняв таблетку.

5. Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Некоторые препараты могут изменить работу Левитры. Проконсультируйтесь с врачом прежде, чем принимать Левитру совместно с какими-либо лекарствами.

- Помните, Левитру нельзя принимать с препаратами, содержащими нитраты.
- Если вы принимаете препараты, называемые альфа-блокаторами, для лечения высокого давления или проблем с предстательной железой, ваше давление может резко снизиться. Вы можете почувствовать головокружение или слабость.
- Если вы принимаете ингибитор протеазы, ваша доза применения Левитры должна быть обязательно согласована с врачом.
- Левитра не должна использоваться с любыми препаратами, которые оказывают влияние на эректильную дисфункцию. Эти препараты включают: таблетки, средства, инъецированные в пенис, вакуумные помпы.

6. Побочное действие.

В общем Левитра переносится хорошо. Побочные эффекты незначительные либо умеренные. К таким относятся: головная боль, покраснение лица, диспепсия (нарушение пищеварения), тошнота, головокружение, ринит. Редко: сонливость, слезящиеся глаза, повышение мышечного тонуса, диспноэ (затруднение дыхания).

7. Условия хранения.

При температуре не выше 30°C , в сухом недоступном для детей месте.

8. Срок годности.

3 года. Не принимайте препарат после даты окончания срока годности, указанной на упаковке.

9. Условия отпуска из аптек.

По рецепту врача.